



## Az első magyarországi mefedron-felmérés eredményei 12 hónap utáni összesítés

**2011. február 17.**

Az EMCDDA Nemzeti Drog Fókuszpont megkeresésére a droginformációval és ártalomcsökkentéssel foglalkozó Magyar Pszichedelikus Közösség ([www.daath.hu](http://www.daath.hu)) weboldalán rövid felmérést végeztünk a mefedron magyarországi használatáról. A 27-  
itemes anonim kérdőív összeállítása és interneten megjelentetése a Daath fórum mefedron témakörében 2010. február 8-án történt meg. A következő 24 óra leforgása alatt összesen 17 válasz érkezett be, mely adatok összesítése emailben került továbbításra a Nemzeti Drog Fókuszpont irányába. A kérdőív a következő 12 hónapban továbbra is online maradt; a 2011. február 17-ig beérkezett, összesen **319** válasz összesítése a következő:

### **Általános információk:**

- A válaszadók életkora 15–41 év között volt, az átlagéletkor 23 év.
- A nemek megoszlása erősen a férfiak irányába tolódik (82% férfi).
- A válaszadók 71%-a az ismerőseitől hallott először a mefedronról, 11% a médiából, 14% pedig az interneten keresztül.
- A mefedron legelterjedtebb “utcai” nevei a *mefi* illetve *kati*, illetve ezek becézett változatai (*mef*, *mefó*, *mefisztó*; *kata*, *katica*, *katalin*), valamint a Daath által elterjesztett „médiahack”-név: a *zsuzsi*.

### **Megjelenés és beszerzés:**

- A válaszadók 90%-a por állagú mefedronnal találkozott, 6%-uk pedig kapszulázott kiszerelesével.
- Körülbelül 25%-uk az interneten rendelte a szert (20% belföldről, 5% külföldről), 66%-uk pedig ismerősétől szerezte be (23% kapta, 43% vásárolta). Csupán 9%-uk vásárolta a mefedront ismeretlen személytől.
- A mefedron beszerzése során a válaszadók 69%-ának nem kínáltak fel egyéb drogokat, 16%-ának egyéb legális drogokat kínáltak fel, 15%-uknak illegális drogokat.

### **Használat és gyakoriság:**

- A válaszadók 81%-a 2010-ben, 17%-a a 2009-es évben próbálta ki először a mefedront; 2009 előtti kipróbálásról csupán 1% számolt be.
- A válaszadók az elmúlt hónapban átlagosan 8, az elmúlt évben pedig 20 alkalommal fogyasztottak mefedront.
- A válaszadók 86%-a intranazálisan (orrba szippantva), 14% pedig orálisan (szájon át) fogyasztotta a mefedront.
- A mefedront a válaszadók 91%-a tipikusan társaságban használta, 9% pedig inkább egyedül.
- A válaszadók 43%-a havonta néhányszor használta/használja a mefedront, 27%-a hetente néhányszor; a naponta többször használók aránya 8%.
- A válaszadók 48%-ának soha nem volt rendszeresnek mondható mefedronhasználata, 31%-ának korábban volt, 21%-ának pedig jelenleg is van.
- A válaszadók 21%-a nem használt a mefedronnal együtt más szereket; a többiek kannabisszal (27%), alkohollal (24%), egyéb stimulánsokkal (12%), illetve nikotinnal (12%) együtt használták a mefedront.

### **Célzat és élményminőség:**

- A mefedronhasználat leggyakoribb célzatai a „hangulatjavítás” (60%), az „érzékelés és jóérzés fokozása” (54%), a „kíváncsiság kielégítése” (40%), és a „társas érintkezés előmozdítása és fokozása” (36%) voltak. Az egyéb válaszok 40%-a a bulizást, partyzást említette meg célzatként.
- A saját bevallásuk szerint korábbi tapasztalatokkal rendelkező válaszadók a mefedron hatásait leginkább az MDMA/Ecstasy (65%), a speed/amfetamin (33%), és a kokain (28%) hatásaihoz tudták hasonlítani.
- 53%-nak nem volt egyetlen negatív élménye sem a mefedronnal, 39%-nak ritkán fordult elő negatív élménye.
- 25% soha, 42% pedig ritkán észlelt negatív utóhatásokat.
- 47% mindenképpen kipróbálná újra a mefedront, 31% valószínűleg igen, 13% pedig „talán”.

### **Adagolás és költségek:**

- Egy adagnyi mefedron tömegét átlagosan kb. 300 mg-ra becsülték a használók.
- 1 gramm mefedron ára 1200 - 12000 Ft között változhat, tipikusan 3000-4000 Ft, a beszerzett mennyiség függvényében.
- A válaszadók az utóbbi hónapban átlagosan 10916 Ft-ot költöttek mefedronra, az utóbbi évben pedig átlagosan 19038 Ft-ot.

### **A 2010. februári és 2011. februári felmérések között megfigyelhető trendek:**

- Az átlagéletkor 21 évről 23 évre, a nők aránya 12%-ról 18%-ra emelkedett.
- A havi prevalencia megháromszorozódott, 2.7-ről 7.9 alkalomra.
- A por-forma elterjedtével a kapszulázott kiserelés aránya 25%-ról 6%-ra csökkent.
- A mefedron beszerzésekor a korábbinál kisebb arányban (20% helyett 15%) kínálnak fel illegális szereket.

*A felmérés részletes adatairól az [enteogen@daath.hu](mailto:enteogen@daath.hu) email-címen lehet érdeklődni.*