

Heroin

diacetylmorphine

Mi a heroin?

- * A heroint ópiummákból állítják elő
- * Az opiátok osztályába tartozik (ide tartoznak még: ópium, kodein, morfiúm, metadon, és az oxikodon.)
- * A heroin lehet barnás vagy fehér por (néha szemcsés), vagy sóltáma (néha ragadós) kátrányszerű.
- * A heroint nagyon gyakran keverik más anyagokkal, ezek közül némelyik erősebb magánál a heroinnál is. Mindig nagyon kevés mennyiséget fogyasztanak először, hogy megbizonyosodjanak a potenciálról.

Hogy fogyasztják?

- * Régen a heroin egy felítható, gyógyszernek minősülő erős fájdalomcsillapító volt.
- * Felszívják, elszívják, de leggyakrabban intravénásan a véráramba fecskendezik.
- * A fecskendzés a legveszélyesebb fogyasztási mód.
- * Az elvonási tünetek nagyon változatosak lehetnek: hasmenés, gyomorproblémák, verejtékezés, viszketés, önkívületi állapot, hányás, szédülés. A fogyasztó gyakran úgy érzi, hogy haldoklik, holtt ezek a tünetek néhány hét múlva eltűnnek.

Mik a hatásai?

- * A hatások erősen függenek az anyag erősségétől, a fogyasztási módtól, és az egyéntől. Tolerancia is fellép, ez körülbelül 3 fogyasztás nélküli nap után szűnik meg.
- * Melegség, eufória, elégedettség érzete, mely gyakran párosul teljes fájdalommentességgel, álomszerű állapottal és tompa érzékeléssel.
- * A fogyasztók rendszerint lefognak, csökken a szexuális teljesítőképességük, gyakoriak a bélrendszeri panaszai.
- * Az élmény alatt a hétköznapi valóságot nem fogadja be a fogyasztó, így könnyen bűncselekmény áldozatává válhat.

Légy óvatos!

- * A heroin rendkívül addiktív szer, mindegyik használati módon (injektálás, szívás, szippantás)
- * A túladagolás még a gyakorlott fogyasztóknak is az egyik legnagyobb kockázati tényező. Mindig csak nagyon kis mennyiséget szabad fogyasztani!
- * A legtöbb túladagolást a más depresszánsokkal való együttes fogyasztás okozza, illetve a pár nap kihagyás utáni, a megszokott mennyiséghez való visszatérés.
- * A fogyasztásra használt eszközök (vatták, kanalak, tűk) közös használata a HIV és hepatitisz kockázatával jár. Ne cseréljétek fogyasztásra alkalmas eszközöket!
- * A fecskendő használata megnöveli a fertőzés és különböző ereket károsító tényezők veszélyét.
- * Mindig használj új és tiszta tűket, fecskendőket. A befecskendezés körüli bőrtületet tisztítsd meg alkoholos kendővel!
- * Tűket mindig tűcsere-programból vagy gyógyszerárakból szerezz!
- * Ha nem tudsz új tűt szerezni, ne próbáld intravénásan adagolni magad, válassz más fogyasztási módot, vagy ne fogassz addig, míg nem tudod biztosítani a biztonságos körülményeket.
- * A heroin Magyarországon illegális, kábítószernek minősülő anyag.

Mit csinálj, ha valaki túladagolja magát?

- * Ha valakinek leáll a légzése, nem tapintható a pulzusa, azonnal hívd a mentőket, majd kezd el lélegeztetni. A mentősök kiérkezésekor mondd el, hogy mit és mennyit fogyasztott az illető, ugyanis a legtöbb esetben ez rengeteget segít. A mentősöknek, orvosoknak titoktartási kötelezettsége van, tehát nem értesíthetik a rendőrséget csupán amiatt, mert valaki heroint használt.