

LSD

Mi az LSD?

* Az LSD (izergsav-dietilamid) egy félszintetikus vegyület; a leghíresebb pszichedelikus drog.
* A folyékony LSD-t általában itatóspapírra (blotter) cseppegtetett kiszerelésben forgalmazzák. Ezek jóval kisebbek egy átlagos bélégynéni (0.6 x 0.6 cm). A folyékony LSD-t légtöbbször kockacukorra szokták csepgetni.

Mik a hatásai?

* Az LSD-élményt gyakran „tripnek”, „utazásnak” is nevezik. A fogyasztó gyakran tapasztalja a hétköznapi valóság teljes megváltozását, amiben többnyire kialakul egy összetett, összefüggő eseménysor. A trip általában négy részre különül el:

* Kezdet - A bevétel után számított fél-egy órával, a színek élesenébbé tünnek, a mozgó tárgyak csíkokat húznak maguk után, a sima felületek „lélegezni” kezdenek.

* Felfutás - A második óra után a hatások egyre intenzívbebbé válnak. Képi hatások bárhol megjelenhetnek, alakok rajzolódhatnak ki a füstben, a tényérben, a felületeken mozgó mintázatok rendeződhetnek be.

* Csúcs - A tér és az idő fogalma megváltozik. Gyakran egy pillanatban érzi mágát a felfiasználó, egy teljesen más világban. Ezek az élmények lehetnek misztikusak, spirituálisak - ez sokakat foglalkoztat témá. Egyesek megriadhatnak az intenzitástól.

* Lejövetel - 5-6 óra után a hatások elkezdenek gyengülni, 8-10 óra után már nincsenek, vagy nagyon gyengék, de érezhető a hétköznapi valóságító való eltérés, illetve az utazó gyakran próbálja felidézni és elemezni élményeit. Körülbelül 12-14 óra múlva lehetővé válik az alvás, mely nagyon pihentető elmeny egy trip után.

Mit csinálunk, ha valakinek bad tripje van?

* Vigyük egy csendes, nyugodt helyre, ahol kényelmesen érezheti magát.
* Kéressünk egy közeli bárátot, aki meg tudja nyugtatni.

* Nyomatékosítunk, hogy az élménye csak a drog hatása miatt van, és hamarosan el fog műlni. Gyakorolt használók megpróbálhatják más irányba terelni a trippet.

* Ha teljesen kezelhetetlenne válik, önmagára, vagy a környezetére veszélyessé válna (ezek szélsőségei sen ritka esetek), hívjuk a mentőket.

Légy óvatos!

* Az LSD előhozhat lappangó mentális betegséget (pl. skizofrénia, paranoia). Ha a családodban előfordult már ilyen betegség, jobb ha nem használsz LSD-t.

* A rosszul megválasztott környezet, rossz lelkí állapotban történő fogyasztás, elvétett dózis minden hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kialakult rossz utazás akkorra traumát okozzon, hogy az a fogyasztás után is foglalkoztassa az embert. Ezek a mély érzelmek időnként felszínre törhetnek. Gyakran jele annak, hogy létezik egy melegoldandó problémánk.

* Extrém ritka (az összes felhasználó kevesebb, mint 1%-a) esetekben az LSD használata maradandó érzékelési zavarhoz (Hallucinogen Persisting Perception Disorder, HPPD) vezethet. Ez gyógyszerek sen kezelhető mellékhatás.

* Soha ne vezess, vagy üzemeltess bármilyen gépet LSD hatása alatt!

* Az LSD Magyarországon illegális, kábítószernek minősülő anyag.